

La Fauvette à tête noire

Nom scientifique : *Sylvia atricapilla*

Occitan : Bartairol de berret

Biométrie :

Longueur : 13,5 – 14,5 cm

Envergure : 20 – 23 cm

Poids : 15 – 23 gr

Etymologie

Nom latin : *Sylvia* : de *silva* : la forêt

atricapilla : de *ater* (noir), *capillus* (cheveu)

Nom français : Fauvette : sa couleur est terne, fauve pour certaines espèces, la calotte noire du mâle fait penser à une chevelure brune.

Description : De teinte générale grisâtre, le mâle a une calotte noire comme un béret, d'où son nom occitan, celle de la femelle et des juvéniles est brun-roux. Son bec fin la désigne comme insectivore, en hiver, elle peut manger des pommes. Elle est très friande de baies de sureau à l'automne, ce qui lui permet de se constituer une réserve de graisse avant la migration ou l'hiver.

Comportement : Très discrète, on l'aperçoit qui se faufile entre les feuilles.

Voix : Son cri d'alarme est un « tek » répété. Le chant du mâle est très varié, clair et fort, il imite même parfois le rossignol, le final est toujours identique. Quelquefois, on entend un faible gazouillement. La connaissance du chant est un atout pour repérer l'oiseau dans le feuillage.

Distribution

Très commune, elle aime les boisements composés de grands arbres, d'arbustes, de buissons assez denses voire les haies où elle niche.

C'est une migratrice partielle, des individus passent l'hiver chez nous. Beaucoup d'oiseaux hivernent maintenant en Angleterre où ils sont nourris.

Quand et où la voir

Elle est présente partout dès qu'il y a des broussailles. Au printemps, le chant et les cris d'alarme facilitent sa localisation. Il faut être très vif pour la repérer dans la végétation.

Bibliographie

Atlas des oiseaux de France métropolitaine, nidification et présence hivernale. Nidal Issa, Yves Muller ; éditions Delachaux et Niestlé.

L'étymologie des noms d'oiseaux ; Pierre Cabard et Bernard Chauvet.

Site internet : www.faune-france.org



Le mâle



La femelle

Statuts

Extrait de la synthèse STOC : www.vigienature.fr

"Effectif : + 24 % en 18 ans. En augmentation en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe. C'est une des espèces les plus répandues en France. C'est un oiseau ubiquiste qui bénéficie du réchauffement climatique, perdant en partie son caractère migrateur, et probablement également de l'accroissement des surfaces forestières. Le taux d'accroissement de sa population semble aujourd'hui marquer le pas, après une progression spectaculaire depuis les années 1980. "

Menaces

La diminution des insectes causée par les pesticides la pénalise.

Protection

L'urbanisation réduit et fragmente les espaces disponibles. Si vous avez un jardin, plantez des arbustes à baies, les oiseaux vous le rendront en vous rapportant des graines dans leurs fientes. J'ai pu ainsi créer une haie avec des cotonéasters, des aubépines et des pyracanthas dont ils m'ont fait cadeau. Quelques Sureaux noirs et des églantiers se sont installés ici et là.

Le bocage lui convient parfaitement. Il faut conserver les haies et les replanter où elles ont été détruites. Ce maillage est une réserve de biodiversité. C'est aussi un corridor qui relie différents milieux et permet à de nombreuses espèces de recoloniser ou de coloniser des zones devenues favorables.