Le groupe des *Ophrys sphegodes* est un véritable casse-tête pour la détermination des différents taxons.

- J'ai essayé par ce diaporama de trouver une aide à la détermination « hors hybrides » .

Pour pouvoir le lire: Actionnez les boutons d'actions.

- Bleu (suivante ou taxons)
- Rouge (confusion possible)
- Jaune (retour aux taxons)

Francis BONNET 2013





# ORCHIDEES

Aide à la Détermination

**Ophrys** 

Sections des Araniferae



Ophrys massiliensis	
Ophrys litigiosa	
Ophrys exaltata arachnitiformis	
Ophrys exaltata marzuola	
Ophrys aranifera	





Retour diapositive précédente



## Ophrys massiliensis

- Floraison très précoce, février, mars à basse altitude, domaine méditerranéen.
- Tige frêle
- Fleurs petites (araneola par exemple)
- Gynostème à angle très fermé, 60° à 80° par rapport au labelle
- Champ basal rouge ou orangé
- Cavité stigmatique plus large que haute
- Gibbosités + ou présentes

#### Confusion possible avec:

- Ophrys exaltata arachnitiformis














## Caractères distinctifs primordiaux outre la précocité de floraison

Angle gynostème et labelle très fermé



Champ basal orangé ou rouge









Cavité stigmatique plus large que haute

pseudo-yeux verdâtres






# Ophrys litigiosa Syn: Ophrys araneola

- Fleurs petites
- Tige forte, paraissant surdimensionnée par rapport aux fleurs
- Labelle avec marge jaune plus ou moins large toujours présente
- Floraison précoce : mars, avril

Confusion possible avec:

- Ophrys virescens










Labelle bombé, gibbosités faibles ou absentes



Cavité stigmatique plus large que haute

Macule en forme de X ou de H, bleutée ◆

Bord jaune du labelle récurvé



## Ophrys exaltata arachnitiformis



Retour aux taxons


#### Syn: Ophrys arachnitiformis

Floraison précoce, février, mars.

- Tige haute, forte,
- Fleurs grandes.
- Rare à absente Aude et P.O
- Gibbosités souvent présentes

#### Confusion possible avec:

- Ophrys exaltata marzuola 🔀



Suivante



Sépales de couleur pâle avec une ligne médiane vert foncé



Cavité stigmatique plus haute que large, pseudo-yeux proéminents, globuleux de couleur noirâtre



Pétales de couleur plus foncé que les sépales, à bords sinueux de couleur plus foncé (ici rougeâtre)



## Ophrys exaltata marzuola

#### Syn: Ophrys occidentalis

Floraison mars, avril

- **Tige forte, hauteur variable**
- Fleurs grandes, de forme et couleur variables
- Pétales et sépales verdâtres, exceptionnellement rosé ou blanche
- Macule très variable
- Appendice présent, souvent proéminent

#### Confusion possible avec:

- Ophrys exaltata arachnitiformis



- Ophrys aranifera






**Suivante** 



Angle gynostème, labelle très ouvert : 90°



Champ basal concolore avec le labelle. Cavité stigmatique, plus haute que large. Pseudo-yeux ronds, proéminents.













Exemple de variabilité des fleurs



## Ophrys aranifera

Syn: Ophrys sphegodes

- Floraison d'avril à mai
- Tige robuste, fleurs nombreuses
- Labelle paraissant allongé
- Gynostème à bec court, faisant un angle fermé avec le labelle
- Appendice très petit

#### Confusion possible avec:

- Ophrys exaltata arachnitiformis



- Ophrys exaltata marzuola





**Suivante** 





Champ basal toujours plus clair que le labelle

Macule souvent bleuâtre



Cavité stigmatique, plus large que haute Pseudo-yeux verdâtres



## Ophrys virescens


#### Ressemble à O litigiosa, mais:

- Tige plus grêle
- Pétales un peu plus larges et plus foncés
- Labelle très bombé, gibbosités absentes
- Floraison tardive : avril à fin mai, 1 mois après *O litigiosa*
- Aspect d'un petit *O passionis*

Confusion possible avec:

- Ophrys litigiosa







Pétales larges, de couleur plus foncés





Sépale dorsal égal ou plus long que le labelle




## Ophrys passionis

- Floraison de mars à mai
- Port robuste
- Fleurs grandes, peu nombreuses
- Pétales très grands, larges à bords sinueux, verts souvent teintés de pourpre
- Labelle très grand, bords pubescents, gibbosités absentes
- Champ basal sombre







Pétales grands, très larges

Labelle grand,

Faiblement trilobés

Bords à forte pilosités







## Ophrys incubacea

- Floraison de mars à mai
- Tige grêle, port élancé
- Fleur assez grande
- Labelle allongé, macule en forme de H
- Champ basal sombre, concolore avec le labelle
- Gibbosités fortes, dressées avec la face interne glabre, brillante. Face externe à forte pilosité








Pétales lancéolés, à bords ondulés

Face externe à forte pilosité



Gibbosités très fortes, face interne glabre, brillante



## O splendida

- Floraison tardive, fin avril à mai
- Domaine méditerranéen,
- Ne dépasse pas Nîmes vers l'Ouest
- Port élégant, « splendide »
- Fleurs de grandes dimensions
- Sépales blancs ou roses, pétales bicolores
- Labelle convexe à marge glabre de couleur jaune, gibbosités faibles à absentes






Pétales bicolores, sépales rosés



Macule bordée d'un fin liseré blanc



Appendice absent ou très petit



## Ophrys aveyronensis

#### Endémique des Causses, Aveyron, Larzac

- Plante à port robuste
- Fleurs grandes, très colorées
- Sépales de couleur rose. Pétales rose vif à rouge vif avec les bords teintés de jaune à rouge orangé
- Labelle entier, souvent plus large que long avec une large bordure velue
- Macule morcelée, très étalée, différente d'une fleur à l'autre
- Floraison de mai à juin





Sépales roses



Pétales roses ou rouge vif, marge orangée

**Macule complexe** 

Bords du labelle 4 très pubescents



Début





Retour à O aveyronensis

Cliquez pour quitter

