

sciences participatives



AGIR pour la BIODIVERSITÉ TARN



Une de ces espèces a été observée ? Vous avez également vu d'autres espèces ?

Envoyez un email à abc.tarn@lpo.fr ou appelez le 05.63.73.08.38

Précisez l'espèce, le nombre, le lieu, la date et d'autres informations utiles (nombre de nid(s), la présence de jeunes, etc).


N'hésitez pas à joindre des photos !

Vous pouvez aussi :

1 Noter vos observations



2 Télécharger l'application **NaturaList** pour contribuer aux recensements de l'Atlas de la Biodiversité Communale



Chevêche d'Athéna

Athene noctua - la Cavèca



Envergure : 50 - 61 cm

Taille : 23 - 27,5 cm

Poids : 150 à 250 g

Ponte : 3 à 5 œufs

Longévité : 16 ans

Habitat : cavités, champs, haie

Aussi appelée Chouette chevêche, elle est plus facilement observable avant l'aube et en fin de période crépusculaire, là où son activité est à son maximum. Elle est sédentaire et très territoriale ! Généralement, les couples sont unis pour toute la vie.

La ponte a lieu entre la mi-avril et la mi-mai, ensuite la femelle couve les œufs pendant 24 à 28 jours, puis les jeunes quittent le nid vers 30 à 35 jours plus tard. Pendant 5 semaines, ils resteront proches du nid pour se faire nourrir encore par leurs parents. Enfin, les jeunes s'émanciperont et s'installeront à moins de 10 km de leur lieu de naissance.



Le saviez-vous ?

Leurs pelotes de rejections brillent car elles sont remplies d'élytres de Coléoptères.



Envergure : 90 à 98 cm
Taille : 34 cm
Poids : 290 à 370 g
Ponte : 3 à 10 œufs

Longévité : 13 ans
Habitat : plaine, bocages, villages

Effraie des clochers

Tyto alba - la Dama blanca



Aussi appelé Chouette effraie, elle est majoritairement sédentaire, mais certaines migrent sur des milliers de kilomètres. Essentiellement nocturne, il est facile de l'apercevoir au crépuscule ou avant l'aube. Cet oiseau solitaire reprend contact avec ses congénères durant la période de reproduction.

La femelle couve entre 29 et 34 jours, puis nourrit ses poussins pendant 25 jours. Les jeunes quittent à l'âge de 3 mois pour ensuite se disperser sur 10 km autour du nid. L'Effraie est spécialisée dans la chasse aux campagnols, c'est donc un allié des agriculteurs.

Le saviez-vous ?

Au Moyen-Âge, ces chouettes étaient cloutées aux portes des granges pour conjurer le mauvais sort. Leur nom vient de leur cri effrayant !



Chouette hulotte

Strix aluco - lo Caüs



Envergure : 93 à 104 cm

Taille : 39 à 42 cm

Poids : 330 à 630 g

Ponte : 3 à 6 œufs

Longévité : 18 ans

Habitat : cavités, arbres à lierre, forêt



Appelé aussi chat-huant de part leur cri, ces chouettes peuvent être grises ou rousses indépendamment du sexe et de l'âge. Possédant des meurs nocturnes, elle est plus facilement observable 40 min avant l'aube et 20 min après coucher du soleil. Les couples sédentaires restent unis toute leur vie.

La couvaison commence fin janvier et dure de 28 à 30 jours. Les poussins restent 28 jours au nid puis sont nourris à l'extérieur du nid pendant 2 à 3 semaines. Il est donc fréquent d'observer des jeunes hors du nid même en pleine journée. Ses capacités d'adaptation lui permettent de vivre dans des espaces boisés proches des milieux urbains.

